成牛市購買者各位

児湯郡市畜産農業協同組合連合会

成牛せり市における公表事項の変更と動物医薬品使用に伴う休薬期間の公表について

時下、日頃より当市場をご愛顧頂き誠にありがとうございます。また、本会事業の取り組みに対し、 ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、成牛せり市における円滑な進行、統一した公表等を図る為、下記のとおり整理をしましたので、何卒ご理解賜ります様宜しくお願い申し上げます。

記

### 1. 変更内容

1) 原則、眼に見える損徴等については、公表しない。

但し、見えにくい場所にあるもの、分かりにくいもの、治療が必要なものは公表する。 尚、眼に見える部分での解約・値引き・治療費請求などの異議申し立てについては、受付 する事が出来ませんので、十分下見の上、ご購買下さいます様お願い申し上げます。

※今後、公表を行わないもの

肩付・肩端の異常、体上線(背線)、耳切、イボ・アマジシ、尾振り・尾切れ・尾曲がり、 角折、キズ痕、オモテキズ、耳標申請中、腰角欠損、皮膚の萎縮、肢弱い

◎但し、出血・化膿、耳標の未申請については公表対象となります。

### 2) 治療歴等の公表

- ①せり前3ヶ月以内に呼吸器系胃腸系の治療歴があるものは全て公表を行う。
- ②せり前3ヶ月以内に限らず、長期間又は複数回の呼吸器系胃腸系の治療歴があるものは公表する。
- 3) 飼料給与報告書への動物医薬品使用に伴う休薬期間の公表

セリ時点において、休薬期間がある薬品を使用した場合は、飼料給与報告書に薬品の種類、 投与日、休薬期間を記載し、公表する。

#### 2. 変更時期

令和6年4月成牛せり市より

3. その他

ご不明な点については、児湯家畜市場(TEL0983-35-1231)までお問い合わせ下さい。

## 飼料給与報告書



せり年月日 令和 年 月 日

現金 · 振込

入場番号

番

【飼育者住所】										
【 飼育者氏名 】								<b>(1)</b>	)	•
個体識別番号				_					_	
名 号		'								
登録記号番号	登録申請中・黒	• 黒原 •	黒高							
品種		和 <u>4</u>	<b>牛 •</b>	交雑	種 •	乳用	 ]牛			
性 別	去勢 ・ 雌 ( 未経産 ・ 経産 )									
生 年 月 日	平成 年 月 日									
血統書の有無		7	有・	無	•	写し	_			
	《配合飼料》《粗:			《 粗 飢	同料 》	*				
	製造会社	食	同料名	ı	粗	飼料	名	産	ť	也
Acces with An										産
飼料名										産
										産
										産
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	※公表事項がある場合にはご記入願います。 <u>※セリ前3ヶ月に限らず、複数回・長期間の治療歴についても記入願います。</u>									
	<b>治療歴がありますか。</b> はい・いいえ									
	治療内容:									
治療歴がある							=	\ <del>48=</del> ^nia <i>X</i>	<b>-</b>	
	•			使用日	<u> </u>	]		診断書(   	月・	
	•			使用日		]		·	]日	
Hend) 쇼_## 다 &						薬【				
使用した薬品名					來【					
	使用日【 / 】 休薬【 】				]日	間				
	・ 使用日【 / 】 休薬【 】日間						間			
	□ スリキズ・切りキズ・腫れ □ 皮膚病(場所: ) □ 皮膚病(場所: ) □ 大き と は で は で は で で は で しゅう と は で しゅう									
	【場所:	<b>/</b> ∨dim+	フ細人」	<u>]</u>		台療有	• 治 <sub>物</sub>	<b>寮中</b> •		<b></b>
	□ イボ・アマジシ □ 角折・角ヒビ(出					 新士 1			]	
病気 ・ 事故	□ オモテキズ()						1	標未申記	 書	
	□ BL検査: -						•	)	14	

# 成牛対象(12ヶ月齢以上)使用薬品一覧 ●は成牛でよく使う薬品等です。

<b>薬</b> 品	投与方法	休薬期間
 亢生物質・サルファ剤	I	
アンピシリンナトリウム	静脈注射	肉3日 牛乳72時間
プロカインペニシリンG	筋肉注射	肉14日 牛乳96時間
マイシリンゾル	筋肉注射	肉90日 牛乳96時間
セファゾリン注	静脈・筋肉注射	肉3日 牛乳36時間
セフチオフルナトリウム注	筋肉注射	肉7日 牛乳24時間
エクセーデC	耳根部皮下注射	肉14日
カナマイ注250	筋肉注射	肉30日 牛乳36時間
マルボシル10%	静脈・筋肉注射	肉4日 牛乳48時間
13 6 6 7 5 07	筋肉注射	肉21日 牛乳72時間
ビクタス5%	静脈注射	肉2日 牛乳24時間
	皮下注射	肉14日間 牛乳60時間
- バイトリル注・エンロフロキサシン注	静脈注射	肉8日 牛乳60時間
OTC注10%	静脈・筋肉・皮下注射	肉14日 牛乳72時間
ダイメトン20%	静脈・筋肉・皮下注射	肉28日 牛乳72時間
ザルソブロカ糖注NZ	静脈注射	肉2日 牛乳24時間
<b>♪</b> ネオアス注	静脈・筋肉・皮下注射	肉10日 牛乳36時間
フルニキシン・フォーベット50	静脈・筋肉注射	肉10日 牛乳60時間
♪ 水性デキサメサゾンA	皮下注射	肉7日 牛乳48時間
その他		
ベルパリン注	静脈・筋肉・皮下注射	肉7日
テルペラン	静脈・筋肉・皮下注射	肉1日 牛乳48時間
エンドコール注	筋肉注射	肉25日 牛乳72時間
パドリニウム	静脈注射	肉21日
ウルソデソキシコール酸10%	静脈注射	肉1日
バソラミン	静脈・筋肉・皮下注射	肉5日 牛乳24時間
ニューボロカールA	静脈・皮下注射	肉3日間
ニューグロンプラス	静脈・皮下注射	肉3日間
☑ ☑虫薬(注射剤)		
イベルメクチン注射剤	皮下注射	肉 4 0日
ドラメクチン注射剤	皮下注射	肉70日

成牛対象 (12ヶ月齢以上) 使用薬品一覧 ●は成牛でよく使う薬品等です。

薬品	投与方法	休薬期間		
● イベルメクチンのポアオン製剤	背線塗布	肉37日		
エプリノメクチンのポアオン製剤		肉20日		
● サンマコー粉剤	 散布	肉7日		
バイチコール	—————————————————————————————————————	肉2日		
消毒薬				
パコマ	 消毒	肉2日		
クリアキル・アストップ等		肉5日		
クレンテ		肉2日		
経口薬				
ダイメトン散等	—————————————————————————————————————	肉7日		
エクテシン液	経口投与	肉7日		
ガスナインS	経口投与	肉3日間		
プリンペラン経口用	経口投与	肉3日間、牛乳72時間		
アセジスト細粒	経口投与	肉21日		
ニューサルマイS	乳房内注入 ※局所塗布も	肉11日間、牛乳96時間		
● セファメジンQR	乳房内注入 ※局所塗布も	肉3日間、牛乳72時間		
● セファメジンDC	乳房内注入 ※局所塗布も	肉30日間		
タイニーPK	乳房内注入 ※局所塗布も	肉50日間、牛乳96時間		
泌乳期用スペクトラゾール	乳房内注入 ※局所塗布も	肉2日間、牛乳72時間		
オキシテトラサイクリン乳房炎用液NZ	乳房内注入 ※局所塗布も	肉14日間、牛乳144時間		
繁殖用薬				
エストラジオール・オバホルモン(E2)	筋肉注射	肉7日間		
● ルテウムデポー	筋肉注射	肉10日間		
● クロフ゜ロステノール・エストレメイト・レシ゛フ゜ロン (PG)	筋肉注射	肉7日間		
ダルマジン(PG)	筋肉注射	肉3日		
● ジノプロスト・プロナルゴン(PG)		肉1日		

主にNOSAI宮崎児湯診療所で使用している薬品を対象としました。

## 子牛対象(12ヶ月齢未満)使用薬品一覧

薬品	投与方法	休薬期間
抗生物質・サルファ剤		
アンピシリンナトリウム	静脈注射	肉3日
アンピシリンゾル20%	筋肉・皮下注射	肉49日
プロカインペニシリンG	筋肉注射	肉14日
マイシリンゾル	筋肉注射	肉90日
セファゾリン注4g	静脈・筋肉注射	肉3日
セフチオフルナトリウム注	筋肉注射	肉7日
エクセーデC	耳根部皮下注射	肉14日
カナマイ注250	筋肉注射	肉30日
フロルフェニコール注200	筋肉注射	肉30日
ニューフロール450	筋肉注射	肉30日
フロルガン	筋肉注射	肉69日
レスフロール	皮下注射	肉45日
ネオマイゾン	筋肉注射	肉21日
タイロシン注200	筋肉注射	肉28日
ドラクシン	皮下注射	肉53日
ザクトラン	皮下注射	肉49日
ミコチル300	皮下注射	肉76日
マルボシル10%	静脈・筋肉注射	肉4日
バイトリルワンショット	皮下注射	肉14日
バイトリル10%・エンロフロキサシン注	皮下注射	肉14日間
ハイトリル10%・エンロノロイリシン注	静脈注射	肉8日
1.5 A A 7 T 0/	筋肉注射	肉21日
├── ビクタス5% 	静脈注射	肉2日
OTC注10%	静脈・筋肉・皮下注射	肉14日
ダイメトン20%	静脈・筋肉・皮下注射	肉28日
解熱・消炎剤		
ザルソブロカ糖注NZ	静脈注射	肉2日
ネオアス注	静脈・筋肉・皮下注射	肉10日

## 子牛対象(12ヶ月齢未満)使用薬品一覧

	投与方法	休薬期間
メタカム2%	皮下注射	肉18日
フルニキシン・フォーベット50	静脈・筋肉注射	肉10日
水性デキサメサゾンA	皮下・静脈注射	肉7日
その他		
ベルパリン注	静脈・筋肉・皮下注射	肉7日
テルペラン	静脈・筋肉・皮下注射	肉1日
エンドコール注	筋肉注射	肉25日
パドリニウム	静脈注射	肉21日
ウルソV注射液1000	筋肉注射	豚7日
ウルソデソキシコール酸10%	静脈注射	肉1日
イーエスイー	臀部筋肉注射	肉34日
バソラミン	静脈・筋肉・皮下注射	肉5日
ニューボロカールA	静脈注射 皮下注射	肉3日間
ニューグロンプラス	静脈注射 皮下注射	肉3日間
イベルメック注	皮下注射	肉 4 0日
ドラメクチン注射剤	皮下注射	肉70日
駆虫薬(塗布・散布)		.t
イベルメクチンのポアオン製剤	背線塗布	肉37日
エプリノメクチンのポアオン製剤	背線塗布	肉20日
サンマコー粉剤	散布	肉7日
バイチコール	散布	肉2日
消毒薬		.i.
パコマ	消毒	肉2日
クリアキル・アストップ等	消毒	肉5日
クレンテ	消毒	肉2日
	<u>.</u>	<u>.i.</u>
アモキシシリン可溶散10%	経口投与	肉10日
OTC可溶散50%	経口投与	肉7日
ダイメトンS散	経口投与	肉7日
エクテシン液	経口投与	肉7日
バイコックス	経口投与	肉59日
ガスナインS	経口投与	肉3日間
プリンペラン経口用	経口投与	肉3日間

## 子牛対象(12ヶ月齢未満)使用薬品一覧

薬品	投与方法		休薬期間	
ニューサルマイS	乳房内注入 ※局	所塗布も同様	肉11日間	
セファメジンQR	乳房内注入 ※局	所塗布も同様	肉3日間	
セファメジンDC	乳房内注入 ※局	所塗布も同様	肉30日間	
タイニーPK	乳房内注入 ※局	所塗布も同様	肉50日間	
泌乳期用スペクトラゾール	乳房内注入 ※局	所塗布も同様	肉2日間	
オキシテトラサイクリン乳房炎用液NZ	乳房内注入 ※局	所塗布も同様	肉14日間	

主に、NOSAI宮崎児湯診療所で使用している薬品を対象としました。